



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya



Campanya de vacunació antigripal 2013-2014


Barcelona, 9 d'octubre de 2013

La grip és un important problema de salut pública

- És una malaltia infecciosa vírica molt contagiosa.
- La incidència de grip durant les epidèmies oscil·la entre el 5% i el 20% en la població general, i arriba al 50% o més en les persones internades en institucions tancades.
- La mortalitat es produeix principalment en persones grans (poden arribar a ser el 90% de les morts) o amb factors de risc preexistents.
- A Catalunya, com a la resta de l'hemisferi nord, la infecció pels virus de la grip habitualment es presenta en forma d'epidèmia anual durant els mesos d'hivern (finals de desembre, gener i febrer).

L'activitat gripal de la temporada 2012-2013 va ser alta a Catalunya

Taxa d'incidència de síndrome gripal i nombre d'aïllaments de virus de la grip A i B. Dades procedents de la xarxa sentinella. Setmanes 40 (2012) - 20 (2013)*




L'onada epidèmica va durar 8 setmanes i va tenir una incidència màxima de 414 casos/100.000 h. a mitjan febrer de 2013

Font: PIDIRAC



Activitat assistencial 2012-2013


Figura 2. Visites per síndromes gripals. Setmana 40 (2012) – 20 (2013)



Font: PIDIRAC




Visites d'atenció primària 2013



Font: Aplicatiu PIUC. CatSalut

Visites d'atenció continuada 2013



Font: Aplicatiu PIUC. CatSalut

La grip va causar a Catalunya 195.034 dies de baixa (7% del total) en la temporada 2012-2013


	Temporada grip (setmana 40 a setmana 20)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Episodis d'IT per temporada:					
IT per grip	29.452	49.193	30.312	33.013	35.868
Total d'IT	710.278	720.483	685.858	628.918	515.410
Indicadors d'IT grip per temporada:					
% d'IT per grip / IT total	4,1%	6,8%	4,4%	5,2%	7,0%
Mitjana d'afiliats actius per temporada	3.249.012	3.111.700	3.085.160	3.001.105	2.883.942
IA temporada/100 afiliats	0,91%	1,58%	0,98%	1,10%	1,24%
Dies d'IT	189.690	344.724	185.613	178.416	195.034
Durada mitjana episodi	6,4	7,0	6,1	5,4	5,4
Durada mediana episodi	5	5	5	4	4

Font: ICAMS


El grup d'edat que va presentar més IT va ser el de 35-44 anys

Distribució de les IT per grip
2012-2013 per grups d'edat

■ 16-24 ■ 25-34 ■ 35-44 ■ 45-54 ■ >=55




Durada mitjana de la IT per grip en
relació amb el grup d'edat 2012-2013



Font: ICAMS

145 casos greus confirmats amb infecció per virus de la grip, la majoria en persones no vacunades

- 145 casos greus confirmats als hospitals sentinella amb infecció per virus de la grip.
- El 94% presentaven algun factor de risc.
- El 88% corresponien a persones no vacunades.
- El 59,4% van ser causats pel virus VGB.
- El 63,4% van ser homes i el 37% dones.
- El rang d'edat dels casos va ser de 0 a 90 anys.
- El 40% van requerir ingrés a la UCI.



Prevenió

- **La vacunació antigripal és la mesura de prevenció primària fonamental per prevenir la grip i les seves complicacions.**

Quan les soques circulants de la vacuna són semblants a les dels virus circulants, l'efectivitat de la vacuna és d'un 70%-90% en adults joves.

- **L'objectiu principal de la vacunació és evitar les complicacions i la mortalitat associada a la grip.**

L'OMS afirma que la vacunació en persones grans redueix el risc de complicacions greus de la grip o mort en un 70%-85%.

Antecedents


- El Programa de vacunacions del Departament de Salut es va fer càrrec de l'organització de la campanya de vacunació antigripal l'any 1994.
- L'any 1994 es van distribuir 714.000 dosis de vacunes. Aquest any es distribuïran 1.200.000 dosis (increment del 68%).



Catalunya i Espanya tenen una bona cobertura de vacunació antigripal estacional en persones grans (UE, 65 anys o més)

Reported seasonal influenza vaccination coverage in older population in EU/EEA countries (n=22)

All countries recommend vaccination of older population



† Sweden- reports were received for only around 60% of the population for 2009-10 influenza season

*Norway- 2008-09 and 2009-10 coverage results calculated for those ≥ 65 and clinical risk groups together

Cobertura a Catalunya:


- 54% en persones de més de 60 anys
- 62% en persones de més de 65 anys

Font: Venice project

Les cobertures són inferiors a les desitjables en persones amb problemes de salut crònics

Reported seasonal influenza vaccination coverage in clinical risk groups in EU/EEA countries (n=7)

All countries recommend vaccination of main clinical risk groups



Norway- 2008-09 and 2009-10 coverage results calculated for those ≥ 65 and clinical risk groups together

Cobertura a Catalunya:

Aprox. el 21% de persones amb problemes de salut crònics entre 15 i 59 anys

Font: Venice project

Objectius de la campanya de la grip 2013-2014

- Millorar la cobertura de vacunació en persones amb problemes de salut crònics (Pla de salut i Pla de prevenció i atenció a la cronicitat).
- Mantenir la cobertura de vacunació en les persones de més de 65 anys i millorar-la en els grups de 60 a 65 anys.
- Millorar la cobertura vacunal dels treballadors de la salut per un doble motiu: perquè poden actuar com una font d'infecció per a persones de risc i perquè formen part del col·lectiu de serveis essencials a la població.



Vacuna recomanada per a la temporada 2013-2014

La vacuna antigripal trivalent recomanada per a la temporada gripal 2013-2014, a l'hemisferi nord (de novembre de 2013 a abril de 2014), ha d'incloure:

- Una soca anàloga a A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 (a).
- Una soca A(H3N2) antigènicament anàloga al virus prototip propagat en cultiu cel·lular A/Victoria/361/2011 (H3N2) (b)*.
- Una soca anàloga B/Massachusetts/2/2012 (linatge Yamagata), que reemplaça la soca B/Wisconsin/1/2010.


S'han produït dos canvis de soques:

- component A (H3N2)
- component B

Accions

- Compra i distribució de vacunes.
- Vacunació en tots els CAP i centres vacunals.
- Informació a la població:
 - Web + materials informatius + 061 CatSalut Respon
- Seguiment de vacunació, vigilància epidemiològica i avaluació.

Es distribueixen 1.200.000 dosis



1.200.000 dosis

4.731.459 €

Grups de risc a vacunar

- **Persones amb alt risc de complicacions**
 - . De 60 anys i més
 - . Pacients amb determinades patologies i factors de risc
 - . Dones embarassades
- **Persones que poden transmetre la grip a persones d'alt risc**
 - . Professionals sanitaris
 - . Contactes i cuidadors de persones d'alt risc
- **Persones que realitzen serveis essencials per a la població**
 - . Policies, bombers, personal de protecció civil, etc.



Procediment de vacunació

- Es recomana la vacunació durant els mesos d'octubre i novembre, de manera que quan s'iniciï la temporada gripal la persona ja estigui immunitzada.
- En tots els centres d'atenció primària i altres centres vacunals de forma programada.




Informació per a ciutadans



4.000 cartells
informatius



Informació per a ciutadans: web Canal Grip al Canal Salut



Web Canal Grip: mesures de prevenció

Mesures de prevenció. Canal Salut. Generalitat de Catalunya - Windows Internet Explorer

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=e3d7b95064f0d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e3d7b95064f0d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda Convertir Seleccionar

Mesures de prevenció. Canal Salut. Generalitat de...

Generalitat de Catalunya
gencat.cat

Canal Salut
La grip

Contacte Castellano

Temes | Serveis | Generalitat | Catalunya

Ciutadania

- ▶ Què és
- ▶ Preguntes més freqüents
- ▶ **Mesures de prevenció**
- ▶ Vacunació
- ▶ Com s'han de cuidar els que tenen grip
- ▶ Utilització dels serveis sanitaris
- ▶ Situació epidemiològica

Professionals

- ▶ Documentació
- ▶ Vacunació
- ▶ Material divulgatiu
- ▶ Enllaços d'interès

Mesures de prevenció

gencat.cat

Atenció a la tos i els esternuts.

Atenció a la tos i els esternuts

La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i seguir unes bones pràctiques d'higiene. Això ajuda a disminuir la transmissió del virus i és l'acció més efectiva per protegir-se i protegir els altres.

Mesures higièniques relatives a les persones

- Quan tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús, i llenceu-lo a la galleda de les escombraries. Si no teniu mocador, tossiu o esternudeu a la part superior de la màniga;
- Renteu-vos les mans amb freqüència amb aigua i sabó durant uns deu o vint segons, o un amb preparat amb alcohol, i eixugueu-vos-les bé (sobretot després de tocar superfícies comunes, com ara baranes, manetes de portes, teclats i ratolins d'ordinador, telèfons, elements de subjecció en el transport públic i després d'esternudar i mocar-vos);
- Ventileu sovint els espais tancats obrint les finestres;
- Eviteu el contacte proper amb persones malaltes de la grip, i no compartiu menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament, i

Listo

Zona desconocida (Mixto)

100%

Informació per a ciutadans: videocàpsules als centres de salut

Vacuneu-vos contra la grip



Tinc una urgència, on m'adrego?



Destaquem



CatSalut Respon
24h
Tens dubtes sobre la grip?



Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya



Guia de centres
On haig d'anar si tinc una urgència ?



Connecta't al Xat
Consulta també per xat

Informació per a professionals: web del Departament de Salut



GUIA TÈCNICA PER A LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ ANTIGRIPIAL ESTACIONAL 2013

Campanya 2013-2014

Programa de vacunacions
Agència de Salut Pública de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Vacunació de professionals sanitaris



Motius:

- Protecció individual
- Evitar el contagi a persones malaltes i a les que tenen un risc més gran de complicacions
- Disminuir la possibilitat de manca de professionals clau

Fullet per a professionals sanitaris

La vacunació contra la grip dels professionals sanitaris. Una responsabilitat de cadascun de nosaltres!

En les epidèmies anuals de grip, cada any entre un 5 i un 15% de la població presenta infeccions del tracte respiratori superior. L'hospitalització i la mort apareixen en grups d'alt risc. Malgrat que és difícil de valorar, l'OMS afirma que cada any hi ha entre 3 i 5 milions de casos de malaltia greu i entre 250.000 i 500.000 morts a tot el món. A Espanya es produeixen aproximadament 3.000 morts anuals.

Els percentatges de vacunació dels professionals sanitaris (*) enfront de la grip necessiten millorar. La Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum, el Departament de Salut, nombroses societats científiques, institucions i organismes internacionals recomanen des de fa anys aquesta mesura preventiva.

Malgrat les campanyes específiques de suport, només un 40% dels professionals es vacunen.

Què hi guanyem vacunant-nos?




Fig. 1. Percentatge de reducció en alguns resultats de salut en professionals sanitaris vacunats contra la grip. Les columnes que fan referència a la mortalitat en pacients mostren dades de dos estudis diferents. Tots els valors mostren diferències estadísticament significatives quan es comparen amb professionals sanitaris no vacunats (p<0,05). Traducció de Talbot, 2005.

Què passa si no ens vacunem?

Els professionals sanitaris no vacunats poden transmetre el virus de la grip als seus pacients quan estan atenent-los. Això és encara més important i preocupant en el cas dels pacients amb alt risc de desenvolupar complicacions a causa de la grip, hospitalitzacions i mort.

Els professionals sanitaris no vacunats poden ser un factor clau en l'extensió de brots epidèmics en centres sanitaris.

Cal recordar que:

- Entre un 30 i un 50% de les persones infectades amb el virus de la grip poden restar asimptomàtiques però transmetre el virus als altres.
- El virus de la grip és contagiós des d'un dia abans del desenvolupament dels símptomes fins a cinc dies després.

Per aquest motiu, fins i tot els professionals sanitaris que deixen d'anar a treballar quan presenten símptomes, conscients del seu paper com a vector de transmissió de la malaltia, poden transmetre la grip en el període asimptomàtic.

D'altra banda, a les èpoques d'epidèmia, si no estan vacunats, els professionals tenen una probabilitat molt més gran d'emmalaltir (ja que estan en contacte amb molts casos de grip) i, per tant, de no poder desenvolupar la seva tasca assistencial en un moment en què l'activitat és molt més alta del que és habitual (amb el perjudici que comporta per la salut individual i col·lectiva).

La vacuna antigripal és la millor mesura per prevenir la grip (en edats per sota de 65 anys la seva efectivitat se situa entre un 70 i un 90%). Les vacunes actuals estan molt purificades i el risc de reaccions locals i generals és molt baix.

Els professionals sanitaris tenen un paper molt actiu en les campanyes de vacunació

Des de fa temps, els professionals sanitaris han assumit un paper clau en la vacunació de la població a la qual atenen, amb unes cobertures a Catalunya que es troben entre les més altes a escala nacional i internacional.

Des del 15 d'octubre al 15 de desembre de 2006, es van administrar gratuïtament 1.336.507 vacunes als centres vacunals de Catalunya. Això representa una cobertura vacunal del 70,2%.

La vacunació antigripal s'adreça especialment a les persones de 60 anys o més, les internades en institucions, les que pateixen malalties cròniques pulmonars, cardíaques, hepàtiques, renals, les diabètiques, les immunodeprimides i les embarassades. També es recomana la vacunació a les que poden transmetre la grip a persones d'aquests grups de risc i a les que ofereixen o treballen en serveis essencials a la comunitat.

Per completar aquesta tasca de prevenció de la grip, és fonamental que els professionals practiquem en nosaltres mateixos el que recomanem als pacients:

És la teva responsabilitat! Vacuna't!
Fes-ho pels altres i per tu mateix.



Tots hi estem exposats.
És la teva responsabilitat

**Vacuna't
contra la grip!**

Fes-ho pels altres i per tu mateix.

© Generalitat de Catalunya. 01/05/2007



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Informació als mitjans de comunicació



Vacuneu-vos
contra la grip si:

**Teniu 60
anys o més**



En resum

- La grip és un important problema de salut pública, tant per la seva freqüència com per la possibilitat de presentar complicacions.
- Té una repercussió important en la productivitat laboral: quasi 200.000 dies de treball perduts.
- La prevenció mitjançant la vacunació és la principal mesura per evitar l'aparició de la malaltia.
- Catalunya fa un important esforç comprant, distribuint i administrant 1,2 milions de dosis de la vacuna.
- Les persones pertanyents als grups de risc poden vacunar-se a partir del dilluns 14 d'octubre als centres de salut.



Esteu embarassada

Teniu 60 anys o més

Teniu malalties cròniques que la grip pot agreujar

Sou professionals de la salut

Cuideu persones que pertanyen a qualsevol dels col·lectius esmentats o hi esteu en contacte

Esteu en centres per a la gent gran o altres institucions tancades

Teniu obesitat mòrbida

Com cada any a la tardor
Vacuneu-vos contra la grip
 Us podeu vacunar al vostre centre de salut

<http://canalsalut.gencat.cat>

061 CatSalut Respon

Generalitat de Catalunya
 Agència de Salut Pública de Catalunya

Us podeu vacunar al vostre centre de salut

Davant la grip
vacuna't
és la teva responsabilitat

Fes-ho pel risc que tens de contraure i transmetre la grip.
 Per tu, per la teva família, pels teus amics i companys
i... per tots els qui estan a les teves mans



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

<http://canalsalut.gencat.cat>