

El Govern millora l'atenció als que pateixen un infart. La mortalitat per aquesta causa s'ha reduït a la meitat.

La mortalitat per infart s'ha reduït a la meitat des de l'any 2000

↓ -50 %

La mortalitat ara és del

6,5 %

als 30 dies de patir l'infart, una de les xifres més baixes d'Europa (a Suècia i Dinamarca és del 7,3%)



La implementació del Codi Infart és un dels factors que ha contribuït a aquesta millora. Aquest protocol urgent centralitza en una xarxa de 10 hospitals la pràctica d'una angioplàstia primària.



Hi ha

6.500

infarts a Catalunya cada any



1 de cada **4**
són dones



Un

40%

dels infarts requereixen tractament urgent a les unitat d'hemodinàmica dels hospitals



Hospitals amb capacitat d'hemodinàmica urgent les 24 hores

- H. de Bellvitge
- H. de Sant Pau
- H. de la Vall d'Hebron
- H. Joan XXIII
- H. Clínic
- H. Josep Trueta
- H. Germans Trias i Pujol
- H. Arnau de Vilanova
- H. del Mar
- Mútua de Terrassa (12 h)

24 h
365 d

2009 | dilluns a divendres | 7 hores
2012 | cada dia | 12 hores
2014 | cada dia | 24 hores



El símptoma principal de l'infart de miocardi és un dolor al pit, intens i perllongat, que no cedeix amb els analgèsics habituals. És un dolor que pot irradiar a altres parts del cos, com per exemple els braços, i que sol anar acompanyat d'un quadre vegetatiu amb suor freda, debilitat i, en ocasions, amb nàusees i vòmits. També es poden percebre dificultats per respirar.

En cas que sentiu un dolor fort i opressiu al pit o sensació de constricció de manera persistent, no dubteu ni un minut i truqueu immediatament al:

112
emergències