


/Salut

Roda de premsa | 4.08.2021

Situació epidemiològica

Taxa de confirmats per PCR/TA per grup d'edat a CATALUNYA a tota la població.



Incidència 7 dies

31/07/2021

0-9 anys: 302.1

10-19 anys: 534.7

20-29 anys: 545.1

30-39 anys: 418.4

40-49 anys: 262.3

50-59 anys: 180.5

60-69 anys: 194.3


70-79 anys: 152.7

80-89 anys: 229


90-99 anys: 345


Incidència: 325.17

Taxa de confirmats per TAR simptomàtics per grup d'edat a CATALUNYA a tota la població.




Visites diàries AP en pacients amb COVID-19 a CATALUNYA a tota la població.






Ingressats totals: 2148 (-78)



Ingressats UCI:
581 (-8)

Defuncions setmanals



Defuncions acumulades:
22760 (+28)

N de casos	ONADA						
grup edat	onada_1	maig-julol 2020	onada_2	onada_3	onada_4	onada_5	total
0	81	5.993	10.536	14.076	8.045	11.697	50.428
10	186	8.550	25.907	25.784	15.774	39.631	115.832
20	2.979	15.386	22.114	24.746	12.746	54.769	132.740
30	4.588	15.261	23.299	26.937	13.954	36.775	120.814
40	7.151	16.376	30.162	35.810	18.645	23.983	132.127
50	8.516	12.376	25.337	30.940	14.477	12.140	103.786
60	6.973	7.088	15.497	20.150	8.433	9.717	67.858
70	7.018	4.305	10.233	13.709	5.370	4.031	44.666
80	9.325	3.592	8.435	10.273	2.405	3.102	37.132
90	6.797	1.946	4.224	4.366	671	1.133	19.137
total	53.614	90.873	175.744	206.791	100.520	196.978	824.520

Incidencia

grup edat	onada_1	maig-julol 2020	onada_2	onada_3	onada_4	onada_5	total
0	0,0%	0,9%	1,5%	2,0%	1,2%	1,7%	7,3%
10	0,0%	1,0%	3,1%	3,1%	1,9%	4,7%	13,8%
20	0,4%	1,9%	2,7%	3,0%	1,5%	6,6%	16,1%
30	0,5%	1,5%	2,3%	2,7%	1,4%	3,7%	12,0%
40	0,5%	1,2%	2,3%	2,7%	1,4%	1,8%	10,0%
50	0,8%	1,1%	2,2%	2,7%	1,3%	1,1%	9,2%
60	0,8%	0,8%	1,8%	2,3%	1,0%	1,1%	7,8%
70	1,1%	0,7%	1,6%	2,1%	0,8%	0,6%	7,0%
80	2,6%	1,0%	2,4%	2,9%	0,7%	0,9%	10,4%
90	7,1%	2,0%	4,4%	4,5%	0,7%	1,2%	19,9%
total	0,7%	1,2%	2,3%	2,7%	1,3%	2,5%	10,6%

UCI (n)	ONADA						
GRUP	onada_1	maig-juliol 2020	onada_2	onada_3	onada_4	onada_5	total
0	1	9	5	4	1	3	23
10	0	5	13	11	6	7	42
20	1	25	23	41	26	69	185
30	1	66	86	101	119	187	560
40	4	147	187	278	244	251	1.111
50	4	200	437	572	431	200	1.844
60	6	278	595	918	572	271	2.640
70	3	240	592	926	551	128	2.440
80	4	115	211	253	107	41	731
90	1	19	13	21	7	6	67
total	25	1.104	2.162	3.125	2.064	1.163	9.643

% casos UCI	ONADA						
GRUP	onada_1	maig-juliol 2020	onada_2	onada_3	onada_4	onada_5	total
0	1,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
10	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20	0,0%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
30	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%	0,9%	0,5%	0,4%
40	0,1%	0,9%	0,6%	0,8%	1,3%	1,0%	0,8%
50	0,0%	1,6%	1,7%	1,8%	3,0%	1,6%	1,6%
60	0,1%	3,9%	3,8%	4,6%	6,8%	2,8%	3,7%
70	0,0%	5,6%	5,8%	6,8%	10,3%	3,2%	5,3%
80	0,0%	3,2%	2,5%	2,5%	4,4%	1,3%	2,3%
90	0,0%	1,0%	0,3%	0,5%	1,0%	0,5%	0,6%
total	0,2%	1,7%	1,5%	1,7%	2,8%	1,1%	1,5%

N defuncions	ONADA						
GRUP	onada_1	maig-juliol 2020	onada_2	onada_3	onada_4	onada_5	total
0	0	0	0	0	0	1	1
10	1	1	1	0	1	0	4
20	10	0	1	3	0	3	17
30	17	6	5	8	1	3	40
40	84	14	32	35	7	3	175
50	246	67	98	137	37	18	603
60	739	149	197	387	141	45	1.658
70	1.968	275	525	865	297	71	4.001
80	4.396	651	1.256	1.796	402	204	8.705
90	4.093	616	1.004	1.298	203	133	7.347
total	11.554	1.779	3.119	4.529	1.089	481	22.551

% letalitat	ONADA						
GRUP	onada_1	maig-juliol 2020	onada_2	onada_3	onada_4	onada_5	total
0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
20	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
30	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
40	1,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%
50	2,9%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,1%	0,8%
60	10,6%	2,1%	1,3%	1,9%	1,7%	0,5%	3,0%
70	28,0%	6,4%	5,1%	6,3%	5,5%	1,8%	8,9%
80	47,1%	18,1%	14,9%	17,5%	16,7%	6,6%	20,2%
90	60,2%	31,7%	23,8%	29,7%	30,3%	11,7%	31,2%
total	15,1%	5,9%	4,6%	5,6%	5,4%	2,1%	6,5%

Letalitat segons edat i estat vacunal a la 5ena onada (des de l'1 de juliol)

grup edat	defuncions			casos			letalitat		
	no vacunats	parcial	completa	no vacunats	parcial	completa	no vacunats	parcial	completa
20	1	0	1	42.765	1.081	2.878	0,002%	0,000%	0,035%
30	1	0	0	27.050	3.793	2.453	0,004%	0,000%	0,000%
40	3	0	1	10.664	5.939	5.139	0,028%	0,000%	0,019%
50	3	0	4	3.690	1.498	6.047	0,081%	0,000%	0,066%
60	5	16	12	1.727	3.396	3.923	0,290%	0,471%	0,306%
70	9	5	44	454	53	3.350	2,0%	9,4%	1,3%
80	32	4	152	248	31	2.698	12,9%	12,9%	5,6%
90	26	2	100	99	21	961	26,3%	9,5%	10,4%


Vigilància de Variants SARS-CoV-2 a Catalunya:

Setmana 28 (12/07 -18/07)

Resultats PCR (cribratge de mutacions) pendents de confirmació per seqüenciació):

- Disminució important variant alpha 8.8%

Figura 1. Percentatge de casos compatibles amb la B.1.1.7 respecte del nombre total de PCR positives fetes amb una PCR capaç de detectar la B.1.1.7. Catalunya desembre 2020 - 18 de juliol de 2021.



Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

Evolució variants predominants a Catalunya VOC+VOI (BIOCOMSC)

L'increment de la variant Delta, molt més transmissible que la resta, ha dominat i substituït a la resta de variants a Catalunya.




Figure 3. Evolution of the fractions of Delta (blue), Alpha (black), Gamma (green) and the B.1.621 (red) variants obtained from the accumulation of the data from sequencing measurements in Can Ruti Sequencing Hub and in the Hospital Universitari Vall d'Hebron. The data is fitted using a sigmoid function obtained from the equations (6-8).

Setmana 29 dades seqüenciació a Barcelona Ciutat

Informe de vigilància de SARS-CoV-2 a l'HUVH

Setmana 29/2021 (19 – 25 de juliol)




Figura 1. Distribució per setmana dels linatges caracteritzats des de març de 2020 (set. 11/2020) a juliol de 2021 (set. 29/2021)

Informe de vigilància de SARS-CoV-2 a l'HUVH

Setmana 29/2021 (19 – 25 de juliol)






Figura 2. Variants circulants durant la setmana 29/2021

Estimació de l'efecte directe de la vacunació en el nombre de casos




Estimació de l'efecte directe de la vacunació en l'ocupació de llits convencionals: actualment hi hauria més de 6.000 persones ingressades (mitjana darrers set dies estaria en 6030)




Dades fins 30 de juliol

Estimació de l'efecte directe de la vacunació en l'ocupació en llits d'UCI: actualment hi hauria més de 1300 ingressats en UCI (mitjana darrers set dies estaria en 1314)



Dades fins 30 de juliol

Estimació de l'efecte directe de la vacunació en el nombre de morts: actualment hauria més de 200 defuncions diàries (mitjana darrers set dies estaria en 213)



Dades fins 30 de juliol


Situació pla de vacunació



Situació del pla de vacunació

Dosis entregadas a Catalunya

9.713.280



Más información:

Dosis entregadas a las comunidades autónomas (acumulado)

Fuente: AEMPS


Aquesta setmana:

407.810


- **Pifzer-BioNtech: 272.610** (dilluns)
- **Moderna: 89.700** (divendres)
- **Janssen: 45.500** (dilluns)

Situació del pla de vacunació


A data 3 d'agost s'han administrat 9.236.970 dosi (un 95,1% de les vacunes rebudes)



Canvi
darrera
setmana



Situació del pla de vacunació



**Vacunació darrera
setmana completa:**

Total: 351.909

Dosi 1: 176.200


Dosi 2: 175.709

**Vacunació setmana
natural dilluns-dimarts**


Total: 97.231

Dosi 1: 65.560

Dosi 2: 31.671



Canvi
darrera
setmana



91,3% de les persones de 60 o més anys han iniciat la vacunació (89,9% finalitzada)
89,2% de les persones de 50 o més anys han iniciat la vacunació (87,8% finalitzada)
76,9% de les persones de 16 o més anys han iniciat la vacunació (68,5% finalitzada)



🔊 S'obre la convocatòria de vacunació per a les persones nascudes entre els anys 2006 i 2009.

* Les que hagin nascut l'any 2009 han d'haver complert els 12 anys per vacunar-se i han de venir acompanyades del seu pare, mare, tutor o tutora legal.

□ <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/ciutadania/2006-2009/>

Prioritat de vacunació:
30 o més anys
Dones embarassades

Important: Aplicar totes les mesures de precaució sempre

0:09



/Salut

i com que la febre no baixava
vaig anar a urgències,

📍 L'imma té 31 anys i es troba ingressada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per una pneumònia per la COVID-19.

📌 Amb la segona dosi, l'efectivitat contra la variant Delta és de més del 80%. I més del 90% si parlem d'hospitalitzacions, per això no abaixem la guàrdia.
#1decada3

12.9K 20:01

0:21

ContacteCovid.cat

T'enviarà un **SMS** en cas que siguis **positiu** perquè...

- Reportis els teus contactes estrets i tallis la cadena de contagis

/Salut

📱 Si ets un cas positiu de COVID-19, rebràs un SMS de [ContacteCovid.cat](https://www.contactecovid.cat) des d'on hauràs de reportar els teus contactes estrets.

Reportar-los i fer correctament l'aïllament de 10 dies és primordial per tallar la cadena de transmissió.

Vacunació contra la COVID-19



Aquesta és la teva dosi

Vine a posar-te-la

Demana dia i hora a
[vacunacovidsalut.cat](https://www.vacunacovidsalut.cat)

/Salut



Si tens **12 anys o més**

VACUNA'T

Demana dia i hora a
[vacunacovidsalut.cat](https://www.vacunacovidsalut.cat)

/Salut

2 d'agost del 2021



IMPORTÀNCIA DE LA VACUNACIÓ COVID-19 EN DONES EMBARASSADES

DIMECRES 4 AGOST
De 13 a 14:15 hores

Enllaç WEBINAR

13:00 a 13:05 h
Benvinguda i moderació
Blanca Prats, Cap Servei Salut maternoinfantil, ASPCAT
Ramon Escarlet, Responsable salut sexual i reproductiva, CatSalut

13:05 a 13:15 h
Situació epidemiològica a Catalunya.
Jacobo Mendioroz, Sub-director general de vigilància i resposta a emergències, ASPCAT

13:15 a 13:25 h
Recomanacions de vacunació contra la COVID en dones embarassades a nivell internacional
Alba Vilajeliu, Consultora en Salut Global

13:25 a 13:35 h
Recomanacions, beneficis i importància de la vacunació
Anna Seneca, Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia

13:35 a 13:50 h
Acompanyament de la dona embarassada.
Com transmetre la informació.
Bermeu Falguera, Associació Catalana de Llevadores
Cristina Martínez, Directora ASSIR ICS

13:50 a 14:00 h
Beneficis per al nadó. Lactància i vacunació
Roser Porta, Societat Catalana de Pediatria

14:00 a 14:10 h
Preca i preguntes

14:10 a 14:15 h
Carmen Cabezas, Secretària de Salut pública, ASPCAT

Supert
Roser Castells



/Salut

Generalitat
de Catalunya

Què cal saber sobre la vacunació contra la COVID-19 en dones embarassades i que alleten un nadó

Les dones embarassades i en el puerperi tenen més risc d'emmalaltir de manera greu per la COVID-19 i de morir per la malaltia que les dones no embarassades. Si estàs embarassada o alletant un nadó, pots vacunar-te contra la COVID-19.

1. Què vol dir que les dones embarassades i en el puerperi tenen més risc d'emmalaltir de manera greu per la COVID-19?

Emmalaltir de manera greu per la COVID-19 fa referència al fet que la malaltia pot tenir conseqüències importants, com ara l'hospitalització, en alguns casos a la unitat de cures intensives (UCI) i respiració assistida (respirador) i que pot fins i tot ocasionar la mort.

A més, les dones embarassades amb COVID-19 tenen més risc d'altres complicacions de la gestació, com el part prematur.

Vacunació COVID-19 embarassades i puerperes segons edat

	DONES	COVID		PAUTA INICIADA		PAUTA COMPLETA	
Embaràs	22.252	3.259	14,65%	4.489	20,17%	2.615	11,75%
Menys de 18	111	26	23,42%	4	3,60%	2	1,80%
De 18 a 24	2.344	432	18,43%	177	7,55%	92	3,92%
De 25 a 34	12.156	1.812	14,91%	2.243	18,45%	1.174	9,66%
De 35 a 44	7.456	972	13,04%	2.004	26,88%	1.303	17,48%
45 o més	185	17	9,19%	61	32,97%	44	23,78%
Puerperi	14.822	1.938	13,08%	7.324	49,41%	4.947	33,38%
Menys de 18	81	14	17,28%	9	11,11%	3	3,70%
De 18 a 24	1.564	290	18,54%	318	20,33%	110	7,03%
De 25 a 34	8.287	1.098	13,25%	3.995	48,21%	2.364	28,53%
De 35 a 44	4.792	531	11,08%	2.935	61,25%	2.408	50,25%
45 o més	98	5	5,10%	67	68,37%	62	63,27%
Total general	37.074	5.197	14,02%	11.813	31,86%	7.562	20,40%

4. Quines són les recomanacions de vacunació?


Si estàs embarassada (en qualsevol moment de la gestació) o alletant un nadó pots vacunar-te contra la COVID-19 al mateix temps que les persones de la teva edat o grup de risc.

A Catalunya, les vacunes disponibles per a dones embarassades i que alleten un nadó de qualsevol edat són d'ARNm (Pfizer i Moderna).

A més, és especialment important vacunar-te si tens altres factors que incrementen el risc d'emmalaltir de manera greu per la COVID-19, com diabetis; obesitat; hipertensió; malaltia del cor, del ronyó, del fetge; afeccions respiratòries greus (fibrosi quística, asma de moderat o greu); o immunodepressió.

El coronavirus SARS-CoV-2 es presenta en onades i actualment, a Catalunya, el nombre de casos de COVID-19 és elevat en grups d'edat que inclouen dones en edat fèrtil. Per tant, amb l'objectiu de controlar la pandèmia i evitar d'emmalaltir de manera greu durant l'embaràs, et pots vacunar en qualsevol moment de la gestació, tal com es recomana a altres països com els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia.


Contagis i ingressos hospitalaris segons estat vacunal
en dones embarassades
(Des de 1 de gener; N=52.666)



- No vacunades tenen 4,2 vegades més risc de contagiar-se
- Si es contagien, tenen 5,4 vegades més risc d'ingressar
- No vacunades tenen un risc multiplicat per 23 de acabar ingressant respecte a vacunades

Les múltiples capes milloren la probabilitat d'èxit

El model de formatge suís de resposta pels virus pandèmics respiratoris, adverteix que CAP MESURA PER SÍ SOLA ÉS PERFECTE per prevenir la propagació del coronavirus. Cada INTERVENCIÓ (capa), TÉ FORATS.



Font: Adaptat de Ian M. Mackay (virologydownunder.com) i, James T. Reason; il·lustració de Rose Wong

<https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html>

Anàlisi dades assistents als Festivals

- Aquests tres grans festivals eren esdeveniments extraordinaris i, per això, van fer tot un seguit de mesures per controlar la transmissió del virus que partien de l'experiència dels concerts de la Sala Apol·lo i del Palau Sant Jordi: Incloïa un TAR previ, que es fessin a l'aire lliure i és continu de mascareta FFP2.
- S'ha fet una anàlisi similar al que vam fer amb les persones que van ser escollides per formar part de les taules electorals: Els assistents als festivals s'han comparat amb una població de control aparellada per edat, sexe, zona de residència (ABS) de residència i estat immunitari enfront SARS-CoV-2.


S'observen almenys 842* casos més entre els assistents que els que serien esperables en persones de les mateixes característiques en els 14 dies posteriors als festivals.


Aquest increment va ser d'entre 1,35 i 2,6 cops en funció del festival.


Nombre de casos en assistents i grup control en els 14 dies posteriors a l'inici del festival

Festival	Assistents aparellats	Casos en assistents		Casos en grup control		Raó de taxes	casos esperats (límit superior)
	N	N	% (IC95%)	N	% (IC95%)		
Vida (1-3 juliol)	8652	466	5,4 (4,9 - 5,9)	197	2,3 (2,0 - 2,6)	2.4 (2,07- 2,69)	225
Canet (3 juliol)	16466	956	5,8 (5,4 - 6,1)	524	3,2 (2,9 - 3,5)	1.8 (1,66-2,0)	576
Cruïlla (8-10 juliol)	24452	857	3,5 (3,3 - 3,7)	571	2,3 (2,1 - 2,5)	1.5 (1,35- 1,67)	636

*842 casos és la suma de les diferències entre el nombre de casos observats en assistents i els casos esperats (tenint en compte el límit superior)







Reflexions i lliçons apreses

- Aquests 3 festivals es desenvolupen en un període de 10 dies que no permet una avaluació intermitja → es comporten com una unitat
- S'aplica l'experiència d'estudis pilots anteriors (condicions experimentals, controlades, nombre d'assistents molt més baix) amb una variant molt menys transmissible
- La variant delta és molt més transmissible
- Els TARs donen sensació de falsa seguretat
- Ja s'han pres mesures (esdeveniments amb públic asseguts, compliment mesures, limitació horària)
- Cal reforçar els missatges de compliment de mesures (mascareta és primordial)

Seguir les recomanacions és la manera de conviure amb el virus

/Salut